

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

AUVERGNE ET LIMOUSIN

DLP - 4 - 10 - 83 230030

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pellissier

63034 Clermont Ferrand Cedex

☎ (73) 92-42-68



BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE

Edition générale

N°29

Le 30 Septembre 1983

COLZA

GROSSES ALTISES

Les captures sont actuellement importantes dans la plupart de nos postes de piégeage de l'Allier, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire.

En Haute-Vienne, celles-ci sont nulles.

PRECONISATIONS

Surveiller vos parcelles et intervenir (si cela n'est pas déjà fait) rapidement si 3 plantes sur 10 présentent des morsures.

CEREALES

DESHERBAGE DE PRELEVEE

Il est recommandé pour lutter contre les graminées.

Actuellement, certains herbicides contrôlent quelques dicotylédones qui lèvent dès l'automne, particulièrement en semis précoces (véroniques).

Ce désherbage doit être effectué sur les parcelles habituellement très sales, celles où l'on pénètre difficilement au printemps (humidité) et aussi en zones d'altitude (froid au printemps).

Pour avoir une bonne efficacité et une bonne sélectivité, il est impératif de réaliser une bonne préparation du sol (pas de mottes) et un semis à une profondeur régulière.

Le désherbage de prélevée ne dispense pas d'un désherbage au printemps.

Il faut choisir l'herbicide en fonction de la flore habituellement rencontrée sur la parcelle.

Pour cela, consulter le tableau au verso.

P279

DIRECTEUR-GERANT: B. MORIN

334

N° de série :

Numéro d'inscription à
la C.P.P.A.P. : 525 AD

Régie de Recettes de la D.D.A.
C.C.P. Clermont-Ferrand 5 503.17

ANNUEL: 100 F

ABONNEMENT

TABLEAU DES HERBICIDES UTILISABLES EN PRELEVÉE

				EPOQUE APPLICATION						DOSE (kg ou l) pc/ha	MAUVAISES HERBES							
				SEMIS	LEVÉE	1 feuille	3 feuilles	1 talle	Plein tallage		Graminées				Dicotylédones			
AVADEX BW,	SEIGLE		**							3,5	Folle Avoine	+	+	++	++	++		
AVADEX BW granulé		**	**							20 - 25 kg	+	+	++	++	++	++		
Spécialités à base de Neburon		**	**							2 500 à 3 600 g M. A.								++
TREPLIK		**	**							BLE : 4 ORGE : 5	+	+	++	++	++	++	++	++
ESCURAN			**							5		++	++	++	++	++	++	
TRAPAN	**	**	**							2,5	+	+	++	++	++	++	+	++
NORLAN T		**	**							5			++	++	++	++		++
CEREPRON NB		**	**							10			++	++	++	++		++
PRODIG	**	**	**							6 - 7	-	+	++	++	++	++		++
TOK E 25 TOP W P 50	**	**								8 - 12	-	++	++	++	++	++		
HERBALT, HERBALT S	**	**								7		++	++	++	++	++	+	++
TOLION	**	**								7		++	++	++	++	++	+	++
IGRANE autosuspendible		**								4		+	++	++	++	++		++
TRIBUNIL		**								4			++	++	++	++		++
DICURAN		**	**							2 000 à 2 500 g M. A.	+	++	++	++	++	++		++
BOCHAMP		**	**							6		++	++	++	++	++	++	++
DINOGRANE SP		*								8		++	++	++	++	++	++	++
CHANDOR TERSIPLENE FERMAX	**	**	**							4	+	+	++	++	++	++	+	++
CLEAN T TRILIXON		**								3 - 4	++	++	++	++	++	++		++

☐ ** Traitement possible
☐ Traitement déconseillé
☐ Possibilité de traitement

☐ risque de phytotoxicité en cas de froid
☐ ++ Résultat satisfaisant
☐ + Résultat moyen

☐ - Efficace en levée d'automne
☐ Résultat insuffisant

Variétés sensibles au Chlortoluron (DICURAN)

Abo, Aiglon, Alto, Arminda, Aviso, Carat,
 Cargo, Corin, Elol, Heima, Hobbil, Kinsman,
 Magister, Marignan, Maris-Huntsman, Match,
 Nautica, Remois, Kiol, Rotonde, Scipion,
 Valmy.

SENSIBILITE AUX HERBICIDES

Variétés moyennement sensibles au Chlortoluron

Albatros, Allégre, Aquila, Axel, Braco, Capitole,
 Caton, Charles Péguy, Docagne, Copain, Favori,
 Fidel, Frégate, Gala, Lano, Marengo, Talent, Tango.